



# Art Beauty Clinic

CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA

## BLEFAROPLASTICA INFERIORE



### Indicazioni

Il mid-facial lifting è un intervento che ha come obiettivo la **rimozione delle borse palpebrali inferiori e non solo**, donando all'intero viso un **aspetto più fresco e riposato**. Nell'ambito dell'invecchiamento facciale, è soprattutto lo sguardo ad invecchiare, per tale motivo non è sufficiente eseguire un semplice intervento di blefaroplastica inferiore con le tecniche tradizionali. Oggi, infatti, si esegue un **mini lifting** (denominato mid-facial) che permette di riposizionare i volumi sotto-palpebrali e zigomatici che si sono dislocati.



### Prima visita

I pazienti che vogliono sottoporsi all'intervento di blefaroplastica inferiore dovranno recarsi presso gli studi del Dott. Luca Spaziante nella città di **Milano**, dove verrà effettuata una prima visita conoscitiva. Alla fine di questa prima consulenza, il dottore sarà in grado di stabilire una stima accurata del risultato ottenibile e spiegherà tutti i dettagli su come avviene l'intervento. Verrà inoltre mostrata la tecnica più adatta, le linee guida da seguire prima e dopo l'operazione.

### Intervento

L'intervento viene eseguito in anestesia locale con sedazione.

Nell'intervento di blefaroplastica inferiore l'incisione viene eseguita a circa 2 mm dalla rima della palpebra inferiore. Il tessuto adiposo in eccesso viene redistribuito nei vari compartimenti anatomici e se necessario si asporta l'eccesso cutaneo, ridonando freschezza e naturalezza allo sguardo. La cute viene suturata con fili molto sottili.

### Avvertenze post-operatorie

- L'intervento viene eseguito in clinica in regime ambulatoriale o di Day Hospital; il paziente potrà dunque essere dimesso il giorno stesso dell'intervento o il mattino successivo. Edema ed ecchimosi variano da paziente a paziente e possono essere di lieve o media intensità e scompaiono fra il quinto ed il decimo giorno.
- Per le prime 24 ore successive all'intervento saranno applicate sugli occhi compresse fredde che verranno cambiate frequentemente.
- Si sconsiglia l'assunzione di antinfiammatori per una settimana prima ed una dopo l'intervento. L'attività lavorativa e i rapporti sociali possono essere ripresi dopo 10-15 giorni.

---

## Dott. Luca Spaziante

SPECIALISTA IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA  
MASTER UNIVERSITARIO IN SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARE  
MASTER UNIVERSITARIO IN CHIRURGIA ESTETICA  
ESPERTO IN MEDICINA ESTETICA E LASERTERAPIA

324.8139420

[www.artbeautyclinic.it](http://www.artbeautyclinic.it)

Galleria Unione, 1 - 20123 Milano