




Art Beauty Clinic

CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA



GINECOMASTIA



Indicazioni

Il torace è di grande importanza nell'estetica del corpo maschile. Si definisce ginecomastia il quadro clinico nel quale la **mammella maschile assume caratteristiche femminili**, specie per quanto riguarda il volume e la prominenza.

Le cause di questa patologia sono diverse, per esempio terapie a base di ormoni, disturbi dell'alimentazione, sindromi, chemioterapia o predisposizione congenita.

Questo difetto può creare un senso di disagio, soprattutto nei mesi estivi.



Prima visita

I pazienti che vogliono sottoporsi all'intervento di ginecomastia dovranno recarsi presso gli studi del Dott. Luca Spaziante nella città di **Milano**, dove verrà effettuata una prima visita conoscitiva. Alla fine di questa prima consulenza, il dottore sarà in grado di stabilire una stima accurata del risultato ottenibile e spiegherà tutti i dettagli su come avviene l'intervento. Verrà inoltre mostrata la tecnica più adatta, le linee guida da seguire prima e dopo l'operazione.

Intervento

L'intervento è sempre eseguibile in day hospital, con ritorno a casa lo stesso giorno.

La ginecomastia si può presentare in 2 forme differenti definite "vera" o "falsa".

Nel primo caso abbiamo come causa un eccesso di tessuto ghiandolare, che viene trattato con l'asportazione chirurgica, con un piccolo taglio sul bordo areolare. Nel caso invece di ginecomastia "falsa" si presenta un eccesso di tessuto adiposo (grasso) senza eccesso ghiandolare, trattato con la lipoaspirazione attraverso un'incisione di pochi millimetri a lato della mammella.

Il chirurgo vi potrà consigliare un esame ecografico per valutare il rapporto tra ghiandola e adipe nelle vostre mammelle, per valutare la tecnica più idonea per risolvere il problema.

L'intervento di ginecomastia riporterà il seno maschile alle dimensioni fisiologiche donando un aspetto armonico.

Avvertenze post-operatorie

- Fin dall'uscita dalla sala operatoria il paziente indosserà una guaina contenitiva che dovrà indossare per alcune settimane a seconda del caso.
- La settimana successiva all'intervento verranno controllate le ferite, non sarà necessario rimuovere i punti in quanto si tratta spesso di suture riassorbibili.
- Si possono presentare edemi ed ecchimosi abbinati ad un lieve gonfiore che inizierà a diminuire poco a poco per scomparire definitivamente dopo alcuni mesi.

Dott. Luca Spaziante

SPECIALISTA IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

MASTER UNIVERSITARIO IN SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARE

MASTER UNIVERSITARIO IN CHIRURGIA ESTETICA

ESPERTO IN MEDICINA ESTETICA E LASERTERAPIA

324.8139420

www.artbeautyclinic.it

Galleria Unione, 1 - 20123 Milano