




Art Beauty Clinic

CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA



MASTOPESSI



Indicazioni

La mastopessi è un intervento chirurgico indicato per le pazienti che presentano un seno svuotato o cadente (ptosico), con perdita di tonicità della mammella. **Si effettua un lifting dei tessuti in grado di sollevare e rassodare il seno ceduto e molto rilassato, il tutto senza l'utilizzo di protesi, non è quindi prevista la variazione del volume della mammella.**

Spesso la ptosi mammaria (solitamente bilaterale) è conseguente ad una gravidanza o ad una notevole riduzione del peso corporeo.



Prima visita

Le pazienti che vogliono sottoporsi all'intervento di mastopessi dovranno recarsi presso gli studi del Dott. Luca Spaziante nella città di **Milano**, dove verrà effettuata una prima visita conoscitiva. Alla fine di questa prima consulenza, il dottore sarà in grado di stabilire una stima accurata del risultato ottenibile e spiegherà tutti i dettagli su come avviene l'intervento. Verrà inoltre mostrata la tecnica più adatta, le linee guida da seguire prima e dopo l'operazione.

Intervento

L'intervento consiste nel **rimodellamento della mammella**, asportando la cute in eccedenza, e della ghiandola mammaria, ricreando una conicità ed una elasticità cutanea che erano andate perdute. Per il lifting della ghiandola viene utilizzata la tecnica dell'Autoprotesi, ossia la ghiandola mammaria stessa viene rimodellata come se funzionasse da protesi per dare la giusta proiezione ed il corretto risollevarsi della mammella.

Le incisioni chirurgiche, un tempo molto estese, grazie agli sviluppi avvenuti anche nell'ambito della chirurgia mammaria riduttiva, sono oggi molto più ridotte e limitate esclusivamente a livello periareolare più un'eventuale incisione verticale.

L'intervento viene eseguito in anestesia generale con ricovero di un giorno e posizionamento di due drenaggi che vengono rimossi dopo 2-4 giorni.

Avvertenze post-operatorie

- Il dolore è contenuto controllato da analgesici per bocca. La paziente indosserà un reggiseno contenitivo che dovrà portare continuamente per 1 mese dopo l'intervento.
- La ripresa lavorativa è prevista dopo 1 settimana, in caso di lavoro più pesante è necessario un periodo di convalescenza più lungo.
- La guida può essere ripresa 2 settimane dopo l'intervento chirurgico.

Dott. Luca Spaziante

SPECIALISTA IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
MASTER UNIVERSITARIO IN SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARE
MASTER UNIVERSITARIO IN CHIRURGIA ESTETICA
ESPERTO IN MEDICINA ESTETICA E LASERTERAPIA

324.8139420

www.artbeautyclinic.it

Galleria Unione, 1 - 20123 Milano